

ENOXAPARINA (también llamada LOVENOX®)

¿Qué es la enoxaparina (Lovenox®)?

- Un medicamento que se utiliza para reducir el riesgo de desarrollar coágulos y accidentes cerebrovasculares.
- Reduce la capacidad de su organismo para producir un coágulo.
- A veces se la denomina heparina de bajo peso molecular.

¿A qué debo estar atento cuando tomo enoxaparina (Lovenox®)?

Los principales eventos a los que debe estar atento cuando toma enoxaparina son los signos de sangrado, coagulación y alergia.

- Signos de sangrado a los que debe prestar atención:
 - Aparición de hematomas sin motivo o agrandamiento de hematomas existentes
 - Sangrado de encías
 - Sangrado de nariz
 - Sangrado vaginal o menstrual más abundante que el normal
- Signos de coagulación a los que debe prestar atención:
 - Enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad o calor en las extremidades (sin relación con el sitio donde se aplicó la inyección)
 - Aumento del dolor en el área donde ya tiene un coágulo
- Signos de alergia a los que debe prestar atención:
 - Urticaria
 - Erupción
 - Picazón

Usted o su hijo deben acudir a la sala de emergencia si presentaran alguno de los siguientes signos:

- Sangrado:
 - Sangrado que no puede detener o que es grave
 - Orina de color rosado o amarronado
 - Heces alquitranadas de color rojo o negro
 - Tos con sangre o con coágulos
 - Vómito con sangre o si el vómito se asemeja a “granos de café”
 - Sangrado interno en la cabeza más comúnmente como consecuencia de un trauma o una lesión: dolor de cabeza grave y sin control; náuseas o vómitos; dificultad para caminar o hablar; cansancio extremo; dificultad para despertarse; llanto agudo en un niño que recibe este medicamento

- Coagulación:
 - Signos de un coágulo en una vena profunda:
 - Enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad o calor en las extremidades (sin relación con el sitio donde se aplicó la inyección)
 - Aumento del dolor en el área donde ya tiene un coágulo
 - Signos de un coágulo en los pulmones (émbolo pulmonar):
 - Dificultad para respirar grave y repentina
 - Dolor en el pecho
 - Tos con sangre o con coágulos
 - Signos de un accidente cerebrovascular:
 - Mareos, pérdida repentina de la visión o dolor de cabeza grave repentino
 - Insensibilidad o debilidad en cualquiera de las extremidades
 - Dificultad para hablar o distorsión del habla
 - Parálisis en un lado del rostro
- Reacción alérgica grave:
 - Dolor u opresión en el pecho
 - Hinchazón del rostro o la lengua
 - Problemas para respirar o sibilancias
 - Mareos o desmayos

¿Qué más debo saber sobre la enoxaparina (Lovenox®)?

- Se inyecta debajo de la piel una o dos veces al día según las indicaciones del médico.
- Puede requerir una extracción de sangre para controlar: el nivel de anti-Xa (a veces llamado inhibidor del factor anti-Xa para la heparina de bajo peso molecular). El nivel se debe evaluar en un momento determinado después de administrar la inyección (generalmente, de 4 a 6 horas después). Su médico le indicará cuándo debe controlar el nivel.
- Se debe almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco (evite guardarlo en el baño).
- Infórmele a su médico si tiene algún problema en los riñones o si ha padecido de sangrado estomacal o de úlceras.
- Indíquele a su médico todos los medicamentos que reciben usted o su hijo (esto incluye medicamentos de venta libre y suplementos a base de hierbas) y los que recién le hayan recetado.
- No tome aspirinas ni AINES sin hablar primero con su médico.
- Indíquele a su médico si usted o su hijo deben someterse a alguna cirugía o procedimiento, incluidos tratamientos dentales importantes.
- Debe hablar con el médico acerca de la participación en deportes ya que algunos pueden aumentar el riesgo de sangrado durante el tratamiento con enoxaparina.
- Puede usar enoxaparina durante el embarazo y la lactancia.

- Si olvida una dosis, tómela de inmediato si está cerca del horario habitual de administración. Si está más cerca de la hora de la próxima inyección, saltee la dosis olvidada y retome el esquema de dosificación habitual.
- Si sospecha de una sobredosis, diríjase de inmediato a la sala de emergencias.

Dosis de enoxaparina que usted o su hijo tomarán en el hogar: _____

Fecha del pedido de control de anti-Xa entregada al paciente o a la familia: _____

Fecha del próximo control de anti-Xa: _____

Motivo por el que usted o su hijo necesitan enoxaparina: _____

Fecha en la que deberá acudir a la clínica para el seguimiento: _____

Número de teléfono al que debe llamar si tiene preguntas o inquietudes: _____