

## FONDAPARINUX (también llamado ARIXTRA®)

### ¿Qué es el fondaparinux (Arixtra®)?

- Un medicamento que se utiliza para reducir el riesgo de desarrollar coágulos y accidentes cerebrovasculares.
- Reduce la capacidad de su organismo para producir un coágulo.

### ¿A qué debo estar atento cuando tomo fondaparinux (Arixtra®)?

Los principales eventos a los que debe estar atento cuando toma fondaparinux son los signos de sangrado, coagulación y alergia.

- Signos de sangrado a los que debe prestar atención:
  - Aparición de hematomas sin motivo o agrandamiento de hematomas existentes
  - Sangrado de encías
  - Sangrado de nariz
  - Sangrado vaginal o menstrual más abundante que el normal
- Signos de coagulación a los que debe prestar atención:
  - Enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad o calor en las extremidades (sin relación con el sitio donde se aplicó la inyección)
  - Aumento del dolor en el área donde ya tiene un coágulo
- Signos de alergia a los que debe prestar atención:
  - Urticaria
  - Erupción
  - Picazón

**Usted o su hijo deben acudir a la sala de emergencia si presentaran alguno de los siguientes signos:**

- Sangrado:
  - Sangrado que no puede detener o que es grave
  - Orina de color rosado o amarronado
  - Heces alquitranadas de color rojo o negro
  - Tos con sangre o con coágulos
  - Vómito con sangre o si el vómito se asemeja a “granos de café”
  - Sangrado interno en la cabeza más comúnmente como consecuencia de un trauma o una lesión: dolor de cabeza grave y sin control; náuseas o vómitos; dificultad para caminar o hablar; cansancio extremo; dificultad para despertarse; llanto agudo en un niño que recibe este medicamento
- Coagulación:
  - Signos de un coágulo en una vena profunda:
    - Enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad o calor en las extremidades (sin relación con el sitio donde se aplicó la inyección)

- Aumento del dolor en el área donde ya tiene un coágulo
- Signos de un coágulo en los pulmones (émbolo pulmonar):
  - Dificultad para respirar grave y repentina
  - Dolor en el pecho
  - Tos con sangre o con coágulos
- Signos de un accidente cerebrovascular:
  - Mareos, pérdida repentina de la visión o dolor de cabeza grave repentino
  - Insensibilidad o debilidad en cualquiera de las extremidades
  - Dificultad para hablar o distorsión del habla
  - Parálisis en un lado del rostro
- Reacción alérgica grave:
  - Dolor u opresión en el pecho
  - Hinchazón del rostro o la lengua
  - Problemas para respirar o sibilancias
  - Mareos o desmayos

### **¿Qué más debo saber sobre el fondaparinux (Arixtra®)?**

- Se inyecta debajo de la piel una vez al día según las indicaciones del médico.
- Puede requerir una extracción de sangre para controlar: el nivel de Arixtra. El nivel se debe evaluar en un momento determinado después de administrar la inyección (generalmente, 3 horas después). Su médico le indicará cuándo debe controlar el nivel.
- Se debe almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco (evite guardarlo en el baño).
- Infórmele a su médico si tiene algún problema en los riñones o si ha padecido de sangrado estomacal o de úlceras.
- Indíquele a su médico todos los medicamentos que reciben usted o su hijo (esto incluye medicamentos de venta libre y suplementos a base de hierbas) y los que recién le hayan recetado.
- No tome aspirinas ni AINES sin hablar primero con su médico.
- Indíquele a su médico si usted o su hijo deben someterse a alguna cirugía o procedimiento, incluidos tratamientos dentales importantes.
- Debe hablar con el médico acerca de la participación en deportes ya que algunos pueden aumentar el riesgo de sangrado durante el tratamiento con fondaparinux.
- Se puede administrar fondaparinux durante el embarazo, pero solo cuando el médico lo indique y de acuerdo con sus instrucciones. No se recomienda su administración en el período de lactancia.
- Si olvida una dosis, tómela de inmediato dentro del mismo día.
- Si sospecha de una sobredosis, diríjase de inmediato a la sala de emergencias.

Dosis de fondaparinux que usted o su hijo tomarán en el hogar: \_\_\_\_\_

Fecha de entrega del pedido de control de fondaparinux (Arixtra) al paciente o a la familia:

\_\_\_\_\_

Fecha del próximo control del nivel de fondaparinux (Arixtra): \_\_\_\_\_

Motivo por el que usted o su hijo necesitan fondaparinux: \_\_\_\_\_

Fecha en la que deberá acudir a la clínica para el seguimiento: \_\_\_\_\_

Número de teléfono al que debe llamar si tiene preguntas o inquietudes: \_\_\_\_\_