

RIVAROXABÁN (también llamado XARELTO®)

¿Qué es el rivaroxabán (Xarelto®)?

- Un medicamento que se utiliza para reducir el riesgo de desarrollar coágulos y accidentes cerebrovasculares.
- Reduce la capacidad de su organismo para producir un coágulo.

¿A qué debo estar atento cuando tomo rivaroxabán (Xarelto®)?

Los principales eventos a los que debe estar atento cuando toma rivaroxabán son los signos de sangrado, coagulación y alergia.

- Signos de sangrado a los que debe prestar atención:
 - Aparición de hematomas sin motivo o agrandamiento de hematomas existentes
 - Sangrado de encías
 - Sangrado de nariz
 - Sangrado vaginal o menstrual más abundante que el normal
- Signos de coagulación a los que debe prestar atención:
 - Enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad o calor en las extremidades
 - Aumento del dolor en el área donde ya tiene un coágulo
- Signos de alergia a los que debe prestar atención:
 - Urticaria
 - Erupción
 - Picazón

Usted o su hijo deben acudir a la sala de emergencia si presentaran alguno de los siguientes signos:

- Sangrado:
 - Sangrado que no puede detener o que es grave
 - Orina de color rosado o amarronado
 - Heces alquitranadas de color rojo o negro
 - Tos con sangre o con coágulos
 - Vómito con sangre o si el vómito se asemeja a “granos de café”
 - Sangrado interno en la cabeza más comúnmente como consecuencia de un trauma o una lesión: dolor de cabeza grave y sin control; náuseas o vómitos; dificultad para caminar o hablar; cansancio extremo; dificultad para despertarse; llanto agudo en un niño que recibe este medicamento
- Coagulación:
 - Signos de un coágulo en una vena profunda:
 - Enrojecimiento, hinchazón, sensibilidad o calor en las extremidades
 - Aumento del dolor en el área donde ya tiene un coágulo
 - Signos de un coágulo en los pulmones (émbolo pulmonar):
 - Dificultad para respirar grave y repentina
 - Dolor en el pecho
 - Tos con sangre o con coágulos

- Signos de un accidente cerebrovascular:
 - Mareos, pérdida repentina de la visión o dolor de cabeza grave repentino
 - Insensibilidad o debilidad en cualquiera de las extremidades
 - Dificultad para hablar o distorsión del habla
 - Parálisis en un lado del rostro
- Reacción alérgica grave:
 - Dolor u opresión en el pecho
 - Hinchazón del rostro o la lengua
 - Problemas para respirar o sibilancias
 - Mareos o desmayos

¿Qué más debo saber sobre el rivaroxabán (Xarelto®)?

- La dosis inicial se toma por vía oral dos veces al día durante 21 días y, luego, una vez al día. Se debe tomar con alimentos a la misma hora todos los días.
- El comprimido se puede pulverizar y mezclarlo con alimentos o agua, si fuera necesario, para que resulte más fácil tragarlo.
- No requiere análisis de laboratorio para el control.
- Se debe almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco (evite guardarlo en el baño).
- Infórmele a su médico si tiene algún problema en los riñones o si ha padecido de sangrado estomacal o de úlceras.
- Indíquele a su médico todos los medicamentos que reciben usted o su hijo (esto incluye medicamentos de venta libre y suplementos a base de hierbas) y los que recién le hayan recetado.
- No tome aspirinas ni AINES sin hablar primero con su médico.
- Indíquele a su médico si usted o su hijo deben someterse a alguna cirugía o procedimiento, incluidos tratamientos dentales importantes.
- Debe hablar con el médico acerca de la participación en deportes ya que algunos pueden aumentar el riesgo de sangrado durante el tratamiento con rivaroxabán.
- Indíquele a su médico si queda embarazada o tiene planeado amamantar mientras toma rivaroxabán ya que no está recomendado para esas etapas.
- Si olvida una dosis, tómela de inmediato cuando lo recuerde, dentro del mismo día.
- Si sospecha de una sobredosis, diríjase de inmediato a la sala de emergencias.
- No deje de tomar rivaroxabán de repente ya que esto podría aumentar el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o desarrollar un coágulo.

Dosis de rivaroxabán que usted o su hijo tomarán en el hogar: _____

Motivo por el que usted o su hijo necesitan rivaroxabán: _____

Fecha en la que deberá acudir a la clínica para el seguimiento: _____

Número de teléfono al que debe llamar si tiene preguntas o inquietudes: _____

© ATHN 2016. Esta hoja de información fue desarrollada por el Comité de Trombosis de ATHN con fondos proporcionados por Becas independientes de Pfizer para aprendizaje y cambio (IGLC, por sus siglas en inglés) y Educación Médica Independiente de Bristol-Myers Squibb. La Comisión conjunta proporciona supervisión administrativa para el programa. El contenido es para fines informativos y no está orientado a proporcionar diagnóstico ni tratamiento médico. El contenido puede usarse en su totalidad o en parte y adaptarse sin permiso, pero no se puede vender. Los usuarios aceptan esta información "tal como se proporciona" y sin garantías de ningún tipo expresas o implícitas. Ninguno de los financiadores ni ATHN son responsables de su uso.